

O ESTRESSE E A RELAÇÃO COM OS DIVERSOS TIPOS DE PSORÍASE

Junho de 2007

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Ibirapuera, como exigência parcial para obtenção do grau de Bacharel e Licenciatura em Ciências Biológicas.

Orientador: Prof^a Ms Laura Scatena

Por: Gabriella Pamela Lopes
Juliana Rosas Corrêa
Renato Reis Matos

Na população, cerca de 3% apresentam um desequilíbrio fisiológico na pele, ocasionado por fatores psicossomáticos, entre estes desequilíbrios inclui-se a psoríase. A medicina ainda não sabe as causas da psoríase, mas há estudos que comprovam a sua ligação com estresse. A psoríase é uma doença de pele não contagiosa que atinge homens e mulheres, cerca de 1 a 3% da população é afetada pela psoríase. A doença se manifesta pelo aparecimento de manchas e placas vermelhas ou róseas, que podem ser de vários tamanhos e cobertas de escamas brancas. O ciclo natural de renovação da epiderme leva cerca de 28 dias, mas nas crises de psoríase, o processo acontece em menos de 4 dias. Há diversos tipos de psoríase: psoríase em placas, psoríase em gotas, psoríase inversa, psoríase eritrodérmica, psoríase postular, psoríase do escalpo, psoríase ungueal e artrite psoriásica; e o tratamento varia de acordo com a severidade de cada caso.

Clique [aqui](#) para ver a monografia, e [aqui](#) para ver a apresentação do trabalho, ambos no formato PDF.